


- 4443 a) $k = -4$
 b) $k = 1,5$
Lösning:
 $(-3)^3 + k \cdot (-3)^2 - k \cdot (-3) + 9 = 0$
 $12k = 18$
 $k = 1,5$
 c) $k = 2$ eller $k = -1$
 d) $k = 3$ eller $k = 4$

4444 $x^3 - 4x - 11$

- 4445 a) $a = \pm 2$
Ledtråd:
 Om $x - a$ är en faktor innebär det att $p(a) = 0$
 b) För alla värden på a .
 c) Sådant värde på a saknas.
Lösning:
 Insättning av a ger:
 $2a^3 - 6a^3 + 4a^3 + 15 = 0 + 15 \neq 0$

Historik Relevans: Carl Friedrich Gauss

1 Ekvationen har fem rötter.



- 3 Vi har ett polynom $f(x)$ med högsta grad n .
 Enligt algebrans fundamentalsats finns det minst en rot x_1 till $f(x) = 0$
 Enligt faktorsatsen är $(x - x_1)$ en faktor till $f(x)$ så
 $f(x) = (x - x_1)g(x)$
 där $g(x)$ är ett polynom med högsta grad $n - 1$.
 Resonemanget upprepas n gånger och vi har visat att det finns exakt n rötter till $f(x)$.

4449 Ekvationen har 30 rötter.

- 4450 $x_1 = 1 \quad x_2 = -2 \quad x_3 = -5$
Ledtråd:
 Dividera polynomet med $(x - 1)$.

- 4451 $x_1 = -5 \quad x_2 = -i \quad x_3 = i$
Ledtråd:
 Dividera polynomet med $(x + 5)$.

- 4452 $x_1 = 2 \quad x_2 = 4i \quad x_3 = -4i$
Lösning:
 Ett nollställe till f är 2 vilket innebär att $f(x)$ innehåller faktorn $(x - 2)$.
 Polynomdivision hjälper oss att faktorisera vänsterledet:
 $(x - 2)(x^2 + 16) = 0$
 Nollproduktmetoden ger:
 $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 2$
 $x^2 + 16 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 4i, x_3 = -4i$

- 4453 $z_1 = 0 \quad z_2 = 2 + i \quad z_3 = 2 - i$
Ledtråd:
 $z(z^2 - 4z + 5) = 0$

- 4454 $p(2 - 5i) = 0$
Ledtråd:
 För polynom med reella koefficienter är icke-reella rötter konjugerade par.

- 4455 a) 4 rötter
Motivering:
 Ekvationen är av fjärde graden.

b) $x_1 = 3i$
 $x_2 = -3i$
 $x_3 = x_4 = 1$

- 4456 a) $x = -1$
 b) $x_1 = -1 \quad x_2 = i \quad x_3 = -i$
Ledtråd:
 Faktorisera $f(x)$ genom att dividera $f(x)$ med $x + 1$.

- 4457 $-6i$ och $4 + i$
Ledtråd:
 För polynom med reella koefficienter är icke-reella rötter konjugerade par.

- 4458 Hon har rätt. Det finns ytterligare två lösningar:
 $x_3 = 2i \quad x_4 = -2i$.
Ledtråd:
 Utför polynomdivision med $(x + 3)(x - 1) = x^2 + 2x - 3$

- 4459 A Sant.
Motivering:
 Tre rötter gör att polynomet måste ha minst grad 3.

- B Sant.
Motivering:
 Om $p(x)$ har reella koefficienter måste $\bar{z}_1 = 2 + i$ och $\bar{z}_3 = -i$ också vara rötter, d.v.s. minst 5 rötter totalt.

C Sant.

- D Falskt.
Motivering:
 Påståendet är sant om $p(x)$ har reella koefficienter då $\bar{z}_1 = 2 + i$ också måste vara en rot.

4460 $z_{1,2} = \pm i \quad z_3 = 3 \quad z_4 = -2$

4461 $x_1 = 3 \quad x_2 = 0,5i \quad x_3 = -0,5i$

4462 $a = 7$ ger lösningarna
 $x_1 = -1, x_{2,3} = -\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{23}i)$

4463 $x_{1,2} = \pm 1, x_{3,4} = \frac{1}{2}(3 \pm \sqrt{3}i)$

4464 $x_1 = 1 \quad x_2 = -2 \quad x_3 = 3$

4465 a) $x_1 = 2 \quad x_2 = 3 \quad x_3 = 4$
 b) $x_1 = 1 \quad x_{2,3,4} = -1$

4466 $z_2 = 1 - i, z_3 = 1, z_4 = -1$

4467 $x_1 = a, x_2 = 2b, x_3 = -3b$

4468 $z_{1,2} = \pm \sqrt{3}i, z_{3,4} = -3 \pm i$

4469 $x_1 = -6 \quad x_2 = 3 + i \quad x_3 = 3 - i$

4502 a) C b) A c) B

- 4503 *Lösning:*
 42 är delbart med 14 om det finns ett heltal k sådant att
 $42 = k \cdot 14$
 $42 = 3 \cdot 14$
 V.S.B.

- 4504 *Lösning:*
 $5x - 1 = 3x + 7$ och $x = 4$ ger
 VL = $5 \cdot 4 - 1 = 19$
 HL = $3 \cdot 4 + 7 = 19$
 VL = HL
 V.S.B.

4505 Lösning:

Från början:

Sidan a .

$$\text{Arean } A_1 = a^2$$

Efter förändring:

Sidan $2a$.

$$\text{Arean } A_2 = (2a)^2 = 4a^2$$

Arean är fyra gånger så stor.

V.S.B.

4506 Lösning:

Det räcker att hitta ett exempel.

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ och } a = 3, b = 4,$$

$$c = 5 \text{ ger}$$

$$VL = 3^2 + 4^2 = 25$$

$$HL = 5^2 = 25$$

$$VL = HL$$

V.S.B.

4507 a) Lösning:

$$VL =$$

$$= (a + b)^2 = (a + b)(a + b) =$$

$$= a^2 + ab + ba + b^2 =$$

$$= a^2 + 2ab + b^2 = HL$$

V.S.B.

b) Lösning:

$$VL = (a + b)(a - b) =$$

$$= a^2 - ab + ba - b^2 =$$

$$= a^2 - b^2 = HL$$

V.S.B.

4508 a) Sant påstående.**b) Inget påstående eftersom det varken är sant eller falskt.****c) Sant påstående.****d) Falskt påstående.****4509 Lösning:**

Från början:

Täljaren a och nämnaren b .

$$\text{Kvoten} = \frac{a}{b}$$

Efter förändring:

Täljaren $1,2a$ och nämnaren $0,8b$.

$$\text{Kvoten} = \frac{1,2a}{0,8b} = 1,5 \frac{a}{b}$$

Kvoten har ökat med 50 %.

V.S.B.

4510 Lösning:

Det räcker att visa att det finns ett tvåsiffrigt tal som påståendet stämmer för.

Prövning ger:

$$x = 10 \text{ ger } 4 \cdot x + 12 = 52.$$

Ej ett kvadrattal.

$$x = 11 \text{ ger } 4 \cdot x + 12 = 56.$$

Ej ett kvadrattal.

$$x = 12 \text{ ger } 4 \cdot x + 12 = 60.$$

Ej ett kvadrattal.

$$x = 13 \text{ ger } 4 \cdot x + 12 = 64.$$

Ett kvadrattal.

V.S.B.

4513 a) \Rightarrow *Motivering:*

$$x > 0 \text{ medför att } x^2 > 0.$$

Omvändningen gäller inte eftersom $x^2 > 0$ också kan medföra att $x < 0$

$$\text{t.ex. } 9 = (-3)^2$$

b) \Leftrightarrow *Motivering:*

$$n \text{ är udda} \Rightarrow n = 2k + 1 \text{ och}$$

$$n = 2k + 1 \Rightarrow n \text{ är udda.}$$

c) \Rightarrow *Motivering:*

$$y = x + 2 \text{ medför } y' = 1.$$

Omvändningen gäller inte.

Det finns flera funktioner

vars derivata är 1.

$$\text{T.ex. } y = x + 1.$$

d) \Leftrightarrow *Motivering:*

$$\lg x = 2 \Rightarrow x = 100 \text{ och}$$

$$x = 100 \Rightarrow \lg x = 2$$

4514 a) $3x + 7 = x + 1 \Rightarrow$

$$2x = -6 \Rightarrow x = -3$$

b) $x = -3 \Rightarrow 2x = -6 \Rightarrow$

$$3x = x - 6 \Rightarrow 3x + 7 = x + 1$$

c) Ja.

$$3x + 7 = x + 1 \Leftrightarrow x = -3$$

4515 a) Ett jämnt tal: $2n$ (n heltal)Ett udda tal: $2k + 1$ (k heltal)

Summan av ett udda och ett

jämnt tal är ett udda tal.

Bevis:

$$2n + 2k + 1 = 2(n + k) + 1 =$$

$$= 2m + 1$$

(m är ett heltal eftersom n och k är heltal)

Summan är ett udda tal.

V.S.B.

b) Två udda tal:

$$2n + 1 \text{ och } 2k + 1$$

(n och k är heltal)

Produkten av två udda heltal

är udda.

Bevis:

$$(2n + 1)(2k + 1) =$$

$$= 4nk + 2n + 2k + 1 =$$

$$= 2(2nk + n + k) + 1$$

$$= 2p + 1 \quad (p = 2nk + n + k)$$

Produkten är ett udda tal.

V.S.B.

4516 a) Påståendet är sant.*Bevis:*

$$n + (n + 1) + (n + 2) =$$

$$= 3n + 3 = 3(n + 1)$$

 $3(n + 1)$ är delbart med 3.**b) Påståendet är falskt.***Motexempel:*

$$2 + 3 + 4 = 9$$

9 är inte delbart med 6.

4517 Sant.*Motivering:*

Symbolerna betyder

” P medför Q som medför R ” P medför alltså R .**4518 $A + B + C = 180^\circ$**

(vinkelsumma)

$$A + B + 90^\circ = 180^\circ$$

$$A + B = 90^\circ$$

$$\sin(A + B) = \sin 90^\circ = 1$$

- 4519 a) Triangeltal: $n(n+1)/2$
Kvadrattal: n^2
b) Slutsats: Summan av två på varandra följande triangeltal är ett kvadrattal.

c) *Lösning:*
Summan av två på varandra följande triangeltal:

$$\begin{aligned} \frac{(n-1)n}{2} + \frac{n(n+1)}{2} &= \\ &= \frac{n^2 - n + n^2 + n}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2 \end{aligned}$$

Summan är ett kvadrattal.
V.S.B.

- 4520 Hon har rätt.

Lösning:
Om n är ett jämnt tal: $n = 2k$,
där k är ett heltal.

Uttrycket kan skrivas:
 $(2k)^2 + 7 \cdot 2k + 12 =$
 $= 4k^2 + 14k + 12 =$
 $= 2(2k^2 + 7k + 6)$

Det sista uttrycket är ett jämnt tal eftersom det innehåller faktorn 2.


Om n är ett udda tal: $2m + 1$,
där m är ett heltal.

Uttrycket kan skrivas:
 $(2m + 1)^2 + 7(2m + 1) + 12 =$
 $= 4m^2 + 4m + 1 + 14m +$
 $+ 7 + 12 = 4m^2 + 18m + 20 =$
 $= 2(2m^2 + 9m + 10)$

Det sista uttrycket är ett jämnt tal eftersom det innehåller faktorn 2.

Om $n = 0$
Uttrycket har värdet 12 som är ett jämnt tal.

- 4521 a) *Lösning:*




Om triangeln är rätvinklig ger cosinussatsen att

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C = \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos 90^\circ = \\ &= a^2 + b^2 \end{aligned}$$

V.S.B.

- b) *Lösning:*



Om Pythagoras sats är uppfylld, d.v.s. $c^2 = a^2 + b^2$,
ger cosinussatsen

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

att $\cos C = 0$

d.v.s. $C = 90^\circ$

V.S.B.

- 4522 *Lösning:*
 n, m heltal ger produkten:

$$\begin{aligned} 2n \cdot 2(n+1) &= 2 \cdot 2 \cdot n(n+1) = \\ &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot m \end{aligned}$$

Den sista likheten motiveras av att antingen n eller $(n+1)$ är ett jämnt tal.

$8m$ är delbart med 8.

V.S.B.

- 4523 I sista steget dividerar vi med $a + b - c = 0$.
Division med noll är inte definierat.

- 4524 *Bevis:*
 $n^3 - n = n(n^2 - 1) =$
 $= n(n-1)(n+1)$

Uttrycket kan skrivas som en produkt av tre på varandra följande heltal, varav ett måste vara delbart med tre och därför hela uttrycket.

(Är $n = 0$, är uttryckets värde noll vilket är delbart med tre.)

V.S.B.

- 4527 a) inte P : n är udda.
b) inte P : $x + y < 4$
c) inte P : $x \neq 2$
d) inte P : Inget barn är en flicka.
e) inte P : Minst en ko kan inte flyga.

- 4528 a) $x > 8 \Rightarrow 0,5x + 2 > 6$
b) $x > 8$ Multiplitera båda leden med 0,5.
 $0,5x > 4$ Addera 2 till båda leden.
 $0,5x + 2 > 6$
V.S.B.

- 4529 a) Det är sommar vilket medför att vi spelar fotboll.
b) Vi spelar inte fotboll vilket medför att det inte är sommar.

- 4530 *Lösning:*
 P : x är ett heltal
 Q : $2x - 5$ kan inte ha värdet 6

Vi ska visa $P \Rightarrow Q$ men visar i stället (inte Q) \Rightarrow (inte P)

$2x - 5$ har värdet 6.

$$2x - 5 = 6$$

$$2x = 11$$

$$x = 5,5$$

x är inte ett heltal.

V.S.B.

- 4531 a) *Lösning:*
 $VL =$
 $= (a-b)^2 = (a-b)(a-b) =$
 $= a^2 - ab - ba + b^2 =$
 $= a^2 - 2ab + b^2 = HL$

V.S.B.

- b) *Lösning:*
 $VL =$
 $= (a-b)^3 =$
 $= (a-b)(a-b)(a-b) =$
 $= (a^2 - 2ab + b^2)(a-b) =$
 $= a^3 - a^2b - 2a^2b + 2ab^2 +$
 $+ ab^2 - b^3 =$
 $= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = HL$
V.S.B.

4532 Lösning:

Det räcker att hitta ett motexempel för att visa att påståendet är falskt. Vi testar därför några udda tal.

$$n = 1 \text{ ger } 4n - 1 = 3.$$

Ett primtal.

$$n = 3 \text{ ger } 4n - 1 = 11.$$

Ett primtal.

$$n = 5 \text{ ger } 4n - 1 = 19.$$

Ett primtal.

$$n = 7 \text{ ger } 4n - 1 = 27.$$

Inte ett primtal!

Påståendet är alltså falskt.

V.S.B.

4533 Lösning:

Det räcker att hitta ett exempel på tredjegradsekvationer som har tre negativa heltalsrötter för att påståendet ska vara sant.

Till exempel har ekvationen

$$(x + 1)(x + 2)(x + 3) = 0$$

lösningarna $x_1 = -1$, $x_2 = -2$ och $x_3 = -3$.

V.S.B.

4534 Lösning:

$P: 3n + 2$ är udda

$Q: n$ är udda

Vi ska visa $P \Rightarrow Q$ men visar i stället n är jämnt $\Rightarrow 3n + 2$ är jämnt.

n är jämnt och kan skrivas $2k$, där k är ett heltal.

$$3n + 2 = 3 \cdot 2k + 2 = 2(3k + 1)$$

$2(3k + 1)$ är ett jämnt tal eftersom det innehåller faktorn 2.

V.S.B.

4535 När man ska bevisa att ett påstående är sant antar man i stället att det är falskt och visar att det leder till en motsägelse.

4536 Antagande: P

Slutsats: Q

I ett direkt bevis visar man att $P \Rightarrow Q$ genom att utgå från P och visa att slutsatsen Q är sann.

I ett indirekt bevis visar man att $P \Rightarrow Q$ genom att i stället visa att $(\text{inte } Q) \Rightarrow (\text{inte } P)$.

4537 a) Om två positiva reella tal båda är mindre än eller lika med 10 medför det att produkten av dessa är mindre än eller lika med 100.

b) $(\text{inte } Q): 0 < x \leq 10$ och

$$0 < y \leq 10$$

$$(\text{inte } P): xy \leq 100$$

c) $0 < x \leq 10$ och $0 < y \leq 10 \Rightarrow$

$$xy \leq 100$$

Vi har därmed bevisat att

$$xy > 100 \Rightarrow x > 10 \text{ eller}$$

$$y > 10$$

4538 a) Lösning:

$P: ab < 0$

$Q: a$ eller b är negativ

Vi ska visa \Rightarrow men visar i stället $(\text{inte } Q) \Rightarrow (\text{inte } P)$

Om både a och b positiva eller båda är negativa kommer produkten att vara positiv, d.v.s. $ab > 0$.

V.S.B.

b) Lösning:

$P: x^2 = x$

$Q: x \geq 0$

Vi ska visa $P \Rightarrow Q$ men visar i stället $(\text{inte } Q) \Rightarrow (\text{inte } P)$

Inte $Q: x < 0$

Inte $P: x^2 \neq x$

Om $x < 0$ är $x^2 > 0$.

Alltså måste $x^2 \neq x$.

V.S.B.

4539 a) Lösning:

$P: 7a + 1$ är ett jämnt tal

$Q: a$ är ett udda tal

Vi ska visa $P \Rightarrow Q$ men visar i stället $(\text{inte } Q) \Rightarrow (\text{inte } P)$

a är ett jämnt tal

$a = 2n$, där n är ett heltal

$7 \cdot 2n + 1 = 14n + 1$ vilket är udda eftersom n är ett heltal.

V.S.B.

b) Lösning:

$P: a^2 - 2a + 7$ är ett jämnt tal

$Q: a$ är ett udda tal

Vi ska visa $P \Rightarrow Q$ men visar i stället $(\text{inte } Q) \Rightarrow (\text{inte } P)$

a är ett jämnt tal

$a = 2n$, där n är ett heltal

$$(2n)^2 - 2 \cdot 2n + 7 =$$


$$= 4n^2 - 4n + 6 + 1 =$$

$$= 2(2n^2 - 2n + 3) + 1 =$$

$$= 2k + 1$$

vilket är udda eftersom k är ett heltal.

V.S.B.

4540 Lösning:

$P: \text{Triangeln är rätvinklig}$

$$Q: a^2 = b^2 + c^2$$

$(\text{inte } P): \text{Triangeln är inte rätvinklig}$

$$(\text{inte } Q): a^2 \neq b^2 + c^2$$

Visar satsen indirekt, d.v.s. att $(\text{inte } Q) \Rightarrow (\text{inte } P)$.

Cosinussatsen gäller för alla trianglar, d.v.s.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Om $a^2 \neq b^2 + c^2$ ger det att

$2bc \cos A \neq 0$ vilket medför att

$A \neq 90^\circ$ eftersom $\cos 90^\circ = 0$,

d.v.s. triangeln är inte rätvinklig.

V.S.B.

4541 **Lösning:**
 $VL = \sin 2v = \sin(v + v) = \sin v \cdot \cos v + \cos v \cdot \sin v = 2\sin v \cos v = HL$
 V.S.B.

4542 **Lösning:**
 $P: x^2 - 2x + a = 0$ har komplexa rötter.
 $Q: a > 1$
 Vi visar med ett direkt bevis.
 $x^2 - 2x + a = 0$
 $x = 1 \pm \sqrt{1-a}$
 $x^2 - 2x + a = 0$ har komplexa rötter då $a > 1$.
 V.S.B.

4543 **Lösning:**
 $P: x^3 + 3x^2 + 7x + 2 = 0$
 $Q: x < 0$
 Vi ska visa $P \Rightarrow Q$ men visar i stället $(\text{inte } Q) \Rightarrow (\text{inte } P)$
 $x \geq 0$ ger att alla termer i uttrycket $x^3 + 3x^2 + 7x$ är större eller lika med noll och $x^3 + 3x^2 + 7x + 2 \geq 2$.
 Detta visar att om $x \geq 0$ så är $x^3 + 3x^2 + 7x + 2 \neq 0$.
 V.S.B.

4544 **Lösning:**
 Ett tvåsiffrigt heltal kan skrivas $10a + b$, där a och b är ensiffriga tal.
 $P: (a + b) = 3 \cdot n$
 $Q: 10a + b = 3 \cdot m$
 där m och n är heltal.
 Vi vill visa att $P \Rightarrow Q$.
 Om $(a + b) = 3n$ är delbart med 3 måste även $9a + (a + b) = 10a + b = 3m$ vara delbart med 3.
 Alltså gäller att $P \Rightarrow Q$.
 V.S.B.


4545 a) **Förklaring:**
 $2b^2$ är delbart med 2, då är a^2 det också.
 Om a^2 är jämnt så är a det med, se uppgift 4526.
 b) Om både a och b går att dela med 2 motsäger det att a/b är förkortat så långt det går.

4546 **Lösning:**
 $P: a$ och b är heltal
 $Q: a^2 - 4b \neq 2$
 Vi ska visa $P \Rightarrow (\text{inte } Q)$ ger en motsägelse.
 a och b är heltal
 $a^2 - 4b = 2$
 $a^2 = 4b + 2$
 $a^2 = 2(2b + 1)$
 a^2 är ett jämnt tal eftersom det innehåller faktorn 2.
 Om a^2 är ett jämnt tal så är även a ett jämnt tal (se uppgift 4526).
 $a = 2n$ och $a^2 - 4b = 2$ ger
 $4n^2 - 4b = 2$
 $2n^2 - 2b = 1$
 $2(n^2 - b) = 1$
 VL är ett jämnt tal och HL är 1 vilket är en motsägelse.
 V.S.B.

4547 **Lösning:**
 Produkt: $x \cdot y$
 x ökar med a procent och y minskar med a procent.
 Ny produkt:
 $\left(1 + \frac{a}{100}\right)x \cdot \left(1 - \frac{a}{100}\right)y = \left(1 - \frac{a^2}{10000}\right)xy$
 Eftersom $a > 0$ kommer den nya produkten att vara mindre än xy .
 V.S.B.

Testa dig själv 4

- a) 2 d) 5
 b) -4 e) $26 + 7i$
 c) $5 - i$ f) $-14 + 23i$
- a) $\frac{9}{10} + \frac{3}{10}i = 0,9 + 0,3i$
 b) $\frac{6}{29} - \frac{15}{29}i$
 c) $\frac{14}{37} - \frac{27}{37}i$
- $z = x + iy$



b) $|z_1| = \sqrt{20}$ $|z_2| = \sqrt{13}$
 $|z_1 - z_2| = \sqrt{37}$
Ledtråd:
 $z_1 - z_2 = 6 - i$

